



CLINIC® XTREME

NOVINKA

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentráту (SL) pro ředění vodou, určený k hubení vytrvalých i jednoletých plevelů na orné půdě, v ovocných sadech, v révě, v obilninách, v bramboru, v cukrovce, v krmné řepě, v kukuřici, ve slunečnici, v lesních porostech, v okrasných a lesních školkách, na loukách a pastvinách a na půdě dočasně neobdělávané.

Název a množství účinné látky: glyfosát 540 g/l

z toho: glyfosát 298 g/l ve formě IPA - soli

z toho: glyfosát 242 g/l ve formě K - soli

- **unikátní a nejnovější formulace glyfosátu**
- baleno také jako „jumbo“ - 640 l
- registrace i pro révu vinnou

NÁVOD K POUŽITÍ:

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k SO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
řepka olejka, barmbor, obilniny, cukrovka, řepa krmná, kukuřice, slunečnice	plevele jednoleté, plevel vytrvalý	1,33–4 l/ha	–	1) před setím/sázením	
řepka olejka, barmbor, obilniny, cukrovka, řepa krmná, kukuřice, slunečnice	plevele jednoleté, plevel vytrvalý	1,2–2 l/ha	–	1) do 5 dnů po výsevu, před vzejitím plodiny	
orná půda - strniště	plevele jednoleté, plevel vytrvalý	1,33–4 l/ha	–	1) po sklizni	5) na svažitých pozemcích
jádroviny, peckoviny, skořápkaté ovoce	plevele jednoleté, plevel vytrvalý	2–5,33 l/ha	–		4) aplikace plošná, aplikace s kryty - max. 50 % plochy

1) Plodina, oblast použití	2) Škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Pozn. k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
jádroviny, peckoviny, skořápkaté ovoce	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	2–5,33 l/ha	–		4) bodová aplikace, aplikace s kryty - max. 30 % plochy
réva	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	2–5,33 l/ha	–	1) od 4. roku po výsadbě	
louky a pastviny	obnova TTP	2,67–4 l/ha	–		
louky a pastviny	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	4 l/ha	–	1) květen-srpen	4) bodová aplikace - max. 30% celkové plochy, 100 l vody/ha
louky a pastviny	šťovík, pcháč	33 % (max. 5,33 l/ha)	–	1) květen-srpen	4) bodová aplikace - max. 30 % celkové plochy
půda dočasně neobdělávaná	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	3,33 l/ha	–	1) před setím nové plodiny	
lesní porosty	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	2–5,33 l/ha	–	1) aplikace 1–2 týdny před výsadbou	4) aplikace plošná
lesní porosty	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	2–5,33 l/ha	–	1) aplikace kolem kmenů, květen až září	4) aplikace s kryty, max. 50% celkové plochy
lesní porosty	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	2–5,33 l/ha	–	1) v období veg. klidu (září až listopad nebo březen až květen)	4) aplikace plošná
okrasné školky, lesní školky	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	3–5 l/ha	–	1) během veg. období, sazenice starší 2 let	4) aplikace meziřádková, aplikace s kryty - max. 50 % celkové plochy, postřik
okrasné školky, lesní školky	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	1,2–2 l/ha	–	1) v období veg. klidu (září až listopad)	4) aplikace plošná, postřik
okrasné školky, lesní školky	plevele jednoleté, plevele vytrvalé	33 % (max. 5,33 l/ha)	–		4) jednotlivé rostliny, aplikace knotem

(-) - ochrannou lhůtu (OL) není nutné stanovit

UPŘESNĚNÍ POUŽITÍ:

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině
branbor, cukrovka, jádroviny, kukuřice, lesní porosty, louky a pastviny, obilniny, orná půda, peckoviny, půda dočasně neobdělávaná, réva, řepa krnná, řepka olejka, skořápkaté ovoce, slunečnice	100–400 l/ha	postřik	1×
lesní školky, okrasné školky	200 l/ha	postřik, aplikace knotem	1×

ZÁKAZY A OMEZENÍ:

Plodina, oblast použití	Zákaz, omezení
louky a pastviny	Zákaz spásání nebo sklizně ošetřených rostlin za účelem zkrmování hospodářským zvířatům.

Aplikujte na aktivně rostoucí plevel. Pýr plazivý by měl mít v době aplikace vyvinuto 4–5 listů (10–15 cm). Vytrvalé dvouděložné plevely jsou nejcitlivější na počátku kvetení. Jednoleté trávy by měly mít vyvinuto aspoň 5 cm listové plochy a jednoleté dvouděložné plevely alespoň 2 pravé listy.

Přípravek nedostatečně účinkuje na přesličku rolní.

Před výsevem plodin se doporučuje odumřelou organickou hmotu rozřezat a zapravit nebo odstranit z pozemku.

Je nezbytné vyhnout se zasažení zelených nebo mladých částí kulturních rostlin.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty.