

CHALCOPRAX A

Charakteristika přípravku a jeho použití v lesnictví:

Návnada obsahující syntetický agregační feromon, založený na principu kombinace biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta lesklého. Používá se ve feromonových lapačích nebo na otrávených lapácích. Formulace ampulová.

Působení přípravku:

Agregační feromon obsažený v polopropustné ampuly je postupně uvolňován skrz stěnu odparníku . Láká samce i samice lýkožrouta lesklého.

Registrované dávky:

Škodlivý činitel	Termín a způsob ošetření
Lýkožrout lesklý	1 odparník/1 feromonový lapač nebo otrávený lapák před začátkem rojení, výměny

Poznámka ke způsobu použití:

Odparníky se vyvěšují těsně před začátkem rojení lýkožrouta smrkového, tj. zpravidla v druhé polovině dubna, ve vyšších nadmořských výškách později. Výměna odparníku se provádí po 8 týdnech.

Feromonové lapače se umísťují podél kůrovcových stěn a do kůrovcových ohnisek, v případě jejich použití v kontrole i na jiné volné plochy podél ohrožených porostů, a to ve vzdálenosti 10 - 15 m od nejbližších smrků. V případě aplikace otrávených lapáků činí bezpečnostní vzdálenost feromonového odparníku od nejbližšího smrku 5-8 m.

Skladování:

Přípravek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných speciálních skladech v souladu s obecnými předpisy, kde nesmí být uložen jiný materiál. Přípravek nesmí přemrznout.