

## ID ECOLURE

Charakteristika přípravku a jeho použití v lesnictví:

Návnada obsahující syntetický agregační feromon, založený na principu kombinace biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta severského. Používá se ve feromonových lapačích.

Působení přípravku:

Agregační feromony jsou po ustřižení alufanové fólie v určené spodní části uvolňovány pomocí knotu po dobu minimálně 8-10 týdnů. Druhé nastřížení (naříznutí), pro zvýšení atraktivity, se může podle potřeby provést po 5-6 týdnech. Láká samce i samice lýkožrouta severského.

Registrované dávky:

Škodlivý činitel	Termín a způsob ošetření
Lýkožrout severský	1 odparník/1 feromonový lapač před začátkem rojení, výměny

Poznámka ke způsobu použití:

Odparníky se vyvěšují těsně před začátkem rojení lýkožrouta severského, tj. zpravidla v druhé polovině dubna, ve vyšších nadmořských výškách později. Výměna odparníku se provádí po 8 týdnech.

Feromonové lapače se umísťují podél kůrovcových stěn a do kůrovcových ohnisek, v případě jejich použití v kontrole i na jiné volné plochy podél ohrožených porostů, a to ve vzdálenosti 10 - 15 m od nejbližších smrků.

Skladování:

Přípravek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných speciálních skladech v souladu s obecnými předpisy, kde nesmí být uložen jiný materiál. Přípravek skladujte při teplotách -5 °C až +10 °C. Při dodržení skladování v neporušených originálních obalech je doba použitelnosti 12 měsíců od data výroby.