

PHEAGR IDU

Charakteristika přípravku a jeho použití v lesnictví:

Feromonový prostředek na lákání lýkožrouta severského (*Ips duplicatus*) v lesních porostech.

Návnada obsahující syntetický agregační feromon, založený na principu kombinace biologických látek s lákavými účinky na lýkožrouta smrkového. Používá se ve feromonových lapačích, na otrávených lapácích, příp. ke zvýšení atraktivity preventivně ošetřeného dříví.

Působení přípravku:

Agregační feromon obsažený v destičce z buničiny je postupně uvolňován skrz stěnu odparníku (speciální fólie). Láká samce i samice lýkožrouta smrkového.

Registrované dávky:

Škodlivý činitel	Termín a způsob ošetření
Lýkožrout smrkový rojení	1 odparník/1 feromonový lapač nebo otrávený lapák před začátkem rojení

Poznámka ke způsobu použití:

Odparník se vyvěšuje v

jednotlivých či skupinových lapácích (štěrbínových, bariérových, přistávacích) umístěných cca 10 m od zdravých porostů a cca 15 m od oslabených porostů a od sebe navzájem cca 20 až 30 m. Odparník je také použitelný do otrávených lapáků nebo pro zesílení náletů na stromové lapáky používané pro ochranu lesních porostů. Účinné látky se uvolňují a prostupují stěnou odparníku, který se po vyjmutí z transportního obalu ihned vyvěšuje bez jakékoliv další úpravy. V závislosti na počasí je účinnost po vyvěšení minimálně 6 týdnů.

Skladování:

Přípravek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných speciálních skladech v souladu s obecnými předpisy, kde nesmí být uložen jiný materiál. Přípravek nesmí přemrznout. Při dodržení skladování v neporušených originálních obalech je doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby.