

PIRIMOR 50 WG

Charakteristika přípravku a jeho použití v lesnictví:

Pirimor 50 WG je postřikový insekticid, řazený mezi karbamáty, upravený jako ve vodě dispergovatelný mikrogranulát. Registrován je proti mšicím.

Působení přípravku:

Pirimicarb, účinná látka přípravku, působí jako selektivní systémový insekticid hubící mšice jako dotykový, dýchací a požerový jed. Proniká do listů odkud je částečně transportován. Působí jako inhibitor cholinesterázy.

Registrované dávky:

Škodlivý činitel Dávka/ha; koncentrace Termín a způsob ošetření

Korovnice 0,1 %; 200 - 300 l/ha vody proti nymfám 1. instaru, postřik

Ostatní mšice 0,1 %; 200 - 300 l/ha vody po zjištění příznaků poškození,
postřik

Poznámka ke způsobu použití:

Savý hmyz

Aplikace se provádí zpravidla v květnu až srpnu při zjištění příznaků napadení. Doporučuje se cca 10 l jichy na 3 - 5 arů.

Skladování:

Přípravek je třeba skladovat v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných speciálních skladech v souladu s obecnými předpisy, kde nesmí být uložen jiný materiál. Přípravek nesmí přemrznout.