

MORSUVIN

Charakteristika a použití přípravku v lesnictví:

Repelentní přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu. Jde o pastovitou směs s vodou mísitelnou, po zaschnutí již vodou nerozpustnou. Obsahuje směs repelentních chuťových a čichových látek s přísadou vytvářející na sazenicích hrubozrnnou porézní ochrannou vrstvu.

Registrace v LH:

Letní okus	- NE
Zimní okus	- ANO
Ohryz a loupání kůry (prevence)	- NE
Asanace po poškození kmenů	- NE
Škody černou zvěří	- NE
Hlodavci	- NE

Působení přípravku:

Přípravek odpuzuje zvěř pachem a mechanicky přítomnou písečnou složkou, která způsobuje tzv. "zubovrz".

Fytotoxicita: v období vegetačního klidu dřevin nefytotoxický přípravek. Při předávkování může dojít ke zpomalení rašení v jarním období nebo odumření vrcholového pupenu.

Registrované dávky:

Druh ochrany	Dávka kg/1000 sazenic	Termín a způsob ošetření
zimní okus		
stromky do 2 let věku	4-5	nátěr, IX-XI, ředí se přidáním 5% vody
starší výsadby	5-6	nátěr, IX-XI, ředí se přidáním 5% vody

Poznámka ke způsobu použití:

Objem a příprava jíchy: přípravek se ředí přidáním 5% vody. Po otevření originálního balení je třeba směs důkladně rozmíchat.

Aplikace: jehličnany se ošetřují po úplném zdřevnatění výhonů, listnáče po zežloutnutí nebo opadu listů. Přípravek se aplikuje nátěrem. Zředěný MORSUVIN nemá skapávat ze štětce. Přípravek je možno použít i na vlhké sazenice a pracovat s ním při minimální teplotě od +2°C. Na mokré sazenice používáme hustší přípravek. Po ošetření musí alespoň částečně zaschnout, protože mráz a déšť čerstvý nátěr porušují. U listnáčů natíráme silnějším nátěrem nejen kmínek, ale i silnější větévky. U jehličnanů natíráme převážně poslední letorost menším množstvím řidšího přípravku, aby nedošlo ke slepování jehlic. Nátěr se provádí nejlépe dvojicí kartáčů na dlouhých rukojetích nebo širokými plochými štětci s prkénky k přidržování sazenic.

Skladování:

Morsuvin se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých, uzamčených skladech při teplotách 0-30°C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem! Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby.

Hořlavina III. stupně